

Saviez-vous qu'il existe des différences importantes entre les analgésiques?

Certains **analgésiques sans ordonnance** peuvent plus ou moins convenir aux personnes qui présentent des affections particulières, comme **l'hypertension artérielle**. Trouvez l'analgésique qui vous convient le mieux :

CONDITION	ACÉTAMINOPHÈNE (p. ex. TYLENOL®)	IBUPROFÈNE (p. ex. ADVIL®, MOTRIN®) NAPROXÈNE SODIQUE (p. ex. ALEVE®, MOTRIMAX 12 HEURES ^{MC})
 Hypertension artérielle	L'analgésique le plus recommandé par les médecins pour les patients qui souffrent d'hypertension.	Consultez un médecin ou un pharmacien avant de prendre un médicament à base d'ibuprofène ou de naproxène sodique si vous souffrez d'hypertension, de maladie cardiaque ou d'insuffisance cardiaque. Ils pourront vous recommander un autre analgésique, tel que l'acétaminophène ^{1,2,3,4} . Aux États-Unis, la <i>Food and Drug Administration</i> a établi que l'ibuprofène et le naproxène sodique peuvent augmenter les risques de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral qui peuvent tous deux être mortels ⁵ .
 Irritations gastriques <ul style="list-style-type: none"> • Ulcère • Maladie inflammatoire de l'intestin (maladie de Crohn, colite) • Saignement gastrointestinal 	L'analgésique le plus recommandé par les médecins pour les patients souffrant d'irritation intestinale.	Consultez un médecin ou un pharmacien si vous avez un ulcère gastroduodéal ou des saignements gastrointestinaux. Vous devez vous abstenir de prendre de l'ibuprofène ou du naproxène sodique ^{1,2,3,4} . Il faut également éviter de prendre du naproxène sodique en présence d'antécédents de maladie inflammatoire de l'intestin ^{2,4} .
 Troubles respiratoires <ul style="list-style-type: none"> • Asthme 	L'acétaminophène peut convenir aux personnes souffrant d'asthme qui présentent un risque accru d'effets secondaires associé à la prise d'analgésiques ⁶ .	Consultez un médecin ou un pharmacien avant de prendre du naproxène sodique si vous souffrez ou avez déjà souffert d'asthme ^{2,4} . Il faut également éviter de prendre de l'ibuprofène si vous avez obtenu un diagnostic d'asthme ^{1,3} .
 Maladie des reins ou du foie <ul style="list-style-type: none"> • Cirrhose • Alcoolisme 	Consultez un médecin ou un pharmacien. Une prise excessive d'acétaminophène peut accroître le risque de lésions hépatiques graves, voire mortelles. Ne prenez pas ce médicament si vous consommez plus de 3 boissons alcoolisées par jour ou si vous avez une maladie du foie.	Consultez un médecin ou un pharmacien. L'ibuprofène et le naproxène sodique ne doivent pas être pris en présence de maladie grave des reins ou du foie ^{1,2,3,4} .
 Âge : 55 ans et plus	Consultez un médecin ou un pharmacien. L'acétaminophène pourrait convenir à certaines personnes qui présentent un risque accru d'effets secondaires associé à la prise d'analgésiques, notamment les personnes plus âgées et celles qui prennent plusieurs médicaments sur ordonnance ⁶ .	Consultez un médecin ou un pharmacien. L'ibuprofène et le naproxène sodique ont des modes d'emploi différents chez les personnes plus âgées ^{1,2,3,4} .
 Prise de plusieurs médicaments	L'acétaminophène pourrait convenir à certaines personnes qui prennent plusieurs médicaments sur ordonnance ou en vente libre ⁶ .	Consultez un médecin ou un pharmacien avant de prendre de l'ibuprofène ou du naproxène sodique si vous prenez déjà plusieurs médicaments sur ordonnance ou en vente libre ^{1,2,3,4} .